

6. 患有血小板減少症或任何凝血功能障礙的人須特別留意，因為疫苗肌肉注射後可能會發生較嚴重血腫症狀。
7. 對酵母菌或佐劑有嚴重過敏反應，或先前曾於接種疫苗後產生過敏反應者，必須告知醫師進行評估。
8. 接種後有異常反應，請通知 24 小時專線電話 0800-88-3513 或新竹市衛生局 03-5355515。

接種後可能有什麼不良事件？

HPV 疫苗是由病毒的一部分蛋白空殼製成，不含病毒基因，所以不會因為接種 HPV 疫苗而感染 HPV 病毒。和其他任何藥品一樣，雖然極少發生，但 HPV 疫苗也有可能造成不良事件。接種 HPV 疫苗後，曾被零星報告過的不良事件，依其通報頻率分類：

- (1) 常見的 ($\geq 1/100$) 有注射部位的反應 (疼痛、發紅、腫脹)、疲倦、頭痛、肌痛、發燒 ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、胃腸道症狀 (包括噁心、嘔吐、腹瀉及腹痛)、發癢/搔癢、皮疹、蕁麻疹、及關節痛。
- (2) 不常見的 ($\geq 1/1,000$ 至 $< 1/100$) 有上呼吸道感染、頭暈、其它注射部位反應 (如硬結、局部感覺異常)、淋巴結病變。
- (3) 罕見的 ($\geq 1/10,000$ 至 $< 1/1,000$) 有過敏反應 (包括全身過敏性與類過敏性反應)、血管水腫、對注射產生暈厥反應或血管迷走神經性反應，有時會伴隨出現僵直陣攣性運動等。

世界衛生組織 (WHO) 在 2015 年 12 月發布一份聲明指出，部分地區發現疫苗注射後會發生複雜性局部疼痛症候群 (complex regional pain syndrome) 和姿勢性直立心搏過速症候群 (postural orthostatic tachycardiasyndrome)、昏倒等暈針反應，特別在青春期的少年間較為普遍。提醒您接種後如果出現不適症狀時，請儘速就醫詢問醫師專業意見。

※參考文獻：WHO. Global Advisory Committee on Vaccine safety Statement on Safety of HPV vaccines. 2015.

何謂暈針反應？

暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，出現頭暈、噁心、臉色蒼白等症狀，大多發生於青少年接種疫苗時。大規模疫苗接種時，特別容易發生聚集性暈針現象，被稱為集體心因性疾病。暈針反應與疫苗本身安全性無關，也不會造成影響身體健康的後遺症。

建議接種者於接種前宜放鬆心情，接種單位可用音樂、影片、聊天等方式化解焦慮，並於接種時採取坐姿。另外，建議於接種後應休息約 30 分鐘，以避免發生昏倒而摔傷。倘若發生暈針狀況，建議先至休息區休息，並緩解情緒緊張，同時通知醫護人員 (在學校應通知學校老師及醫護人員)。如暈針現象持續，宜送醫診治。

提醒您，接種 HPV 疫苗前應詳細閱讀相關說明 (最新仿單資訊請掃右圖 QR code)，少數人接種後有可能產生不良事件，為了保障注射安全，請先給醫師評估後再接種。如身體有任何特殊狀況 (懷孕、個人過敏史、發燒、血液疾病、免疫系統疾患或其他症狀等) 或疾病，均須事先告知接種醫師，醫師評估適合接種後再進行施打。



※HPV 疫苗之最新仿單資訊或相關防治措施，請參閱國民健康署網站：<https://www.hpa.gov.tw>

本署辦理 HPV 疫苗接種，是採取自願參加方式。只有接種對象與家長在「HPV 疫苗接種同意書」上勾選同意且簽名，才予以安排接種疫苗。

24 小時專線電話 0800-88-3513 或新竹市衛生局 03-5355515

本項服務經費來自衛生福利部國民健康署菸品健康福利捐